

Erfahrungsbericht Barbara Hinz

Wundbehandlung mit LIGASANO® bei eingewachsenem Nagel

Patientendaten und Anamnese:

Patientin, 25 Jahre, Zustand nach fehlgeschlagener beidseitiger Emmert-Plastik bei eingewachsenem Nagel. Chirurgischer Eingriff fand am 17.09.2014 statt. Zusätzliche systemische Antibiose war notwendig.



Abb. 1: 01.08.2015 Zustand vor Behandlung mit LIGASANO®



Abb. 2: 04.08.2015 Behandlung mit LIGASANO® weiß Wundverband



Abb. 3: 04.08.2015 Behandlung mit LIGASANO® weiß Wundverband



Abb. 4. 11.08.2015 Behandlung mit LIGASANO® weiß Wundverband



Abb. 5: 18.08.2015 Verbandwechsel



Abb. 6: 18.08.2015 Unterfütterung der Nagelfalze mit LIGASANO® weiß steril



Abb. 7: 18.08.2015 Unterfütterung der Nagelfalze mit LIGASANO® weiß steril



Abb. 8. 18.08.2015 LIGASANO® Zehenschlauch als Druckschutz



Abb. 9: Zustand am 15.09.2015



Abb. 10: Zustand am 12.10.2015



Abb. 11: Zustand am 04.11.2015



Abb. 12. Zustand am 02.06.2016