

H

LIGAMED® ITALIA

Experts for wound healing + prevention

SINI-MEDIK

Niederreiter GmbH



PLASTICA RICOSTRUTTIVA

ORTOPEDIA

GERIATRIA

CENTRO USTIONI

PRONTO SOCCORSO

ANGIOLOGIA

DERMATOLOGIA

TRAUMATOLOGIA

CHIRURGIA

piaga trocantere

LIGASANO®

semplicemente funziona

- **Paziente colpito da ictus cerebrale allettato da due anni, Portatore di gastrostomia alimentare.**
- **Frequenti episodi febbrili causati da problemi respiratori legati alla disfagia.**
- **Ogni episodio febbrile contribuisce ad un notevole peggioramento delle piaghe da decubito.**



- L'impiego del **LIGASANO®** per la medicazione della gastrostomia evita il ristagno di secrezioni e quindi la macerazione dei tessuti circostanti la stomia.





**con la prima medicazione della
piaga da decubito, si è ottenuto
la completa scomparsa del
cattivo odore che si avvertiva
ancora prima di entrare nella
camera del paziente.**





- Tutta la cavità circostante la piaga viene accuratamente zaffata con **LIGASANO®**
- La medicazione viene effettuata a giorni alterni e il *doppio* strato esterno di **LIGASANO®** viene rimosso inizialmente due volte al giorno.
- (** Quando una piaga secerne molto essudato si può aumentare lo spessore esterno della medicazione per favorire l'effetto drenante evitando così il ristagno e il contatto dei liquidi stessi con i tessuti sani).

- **Soltanto per le prime medicazioni è stato utilizzato un disinfettante per la cute circostante la piaga.**











- La cavità circostante la piaga, si riduce molto rapidamente.
- Ad ogni medicazione il **LIGASANO®** viene accuratamente introdotto in tutto lo scollamento dei tessuti.
- “è fondamentale” drenare perfettamente tutta la cavità delle piaga.











- **Non è più stato praticato nessun tampone della ferita per esame culturale e antibiogramma.**
- **La terapia antibiotica viene soltanto effettuata al bisogno e mirata al problema respiratorio.**













PRESIDI UTILIZZATI

LIGASANO®



www.nonsolostomia.com