



### Patientendaten und Anamnese:

75jähriger männlicher Patient mit CVI beidseitig. Posttraumatisches Ulcus an der linken Tibia nach Anstosstrauma Anfang März 2019. Nimmt Antikoagulantien, postthrombotisches Syndrom, Kompressionsverband.



**Abb. 1:** Wundzustand Anfang März 2019: Teilweise frisch blutende, 7 x 2 cm große Wund nach Anstoßtrauma, mäßig exsudierend, klaffende Wundränder, oberhalb ödematös gespannte Wundumgebung



**Abb. 2:** Wundzustand am 29.03.2019: 5 x 2 cm große Wunde, mäßig exsudierend, klaffende Wundränder, fibrinbelegter Wundgrund, Patient lehnt operative Versorgung mit Spalthauttransplantation ab. Reinigung mit LIGASANO® Wundputzer® Intensiv und Wundspüllösung. Wundversorgung mit LIGASANO® weiß, Verbandwechselintervall alle 3 Tage, weiterhin Kompressionsverband



**Abb. 3:** Wundzustand am 02.05.2019: Wunde fast vollständig epithelisiert, Abschluss der Behandlung bei komplettem Wundverschluss am 16.05.2019

### Autorinnen:

Sabine Herler, Krankenschwester, Wundexpertin ICW, und Sybille Ullrich, Krankenschwester, Wundexpertin ICW, beide angestellt im Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach, Plastische Chirurgie/Wundmanagement